

# BAC BLANC

SESSION 2011

## ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES

Série : TS, enseignement obligatoire  
coefficient : 7

L'usage des calculatrices est autorisé, les documents sont interdits.

Durée de l'épreuve : 4 heures.

Le sujet comporte 5 pages.

*Les quatre exercices sont indépendants. Ils peuvent être traités dans n'importe quel ordre, à condition que la présentation soit claire pour le correcteur. Tout résultat donné dans l'énoncé peut être utilisé même s'il n'a pas été démontré pour poursuivre l'exercice. Le soin apporté à la rédaction et à la présentation sera pris en compte dans la note finale.*

## Exercice 1 : Analyse (6 points)

### PARTIE A

1) On considère deux suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telles que :

- la suite  $(u_n)$  est croissante,
- la suite  $(v_n)$  est décroissante,
- la suite  $(w_n)$  définie par  $w_n = v_n - u_n$  converge vers 0.

- (a) Démontrer que la suite  $(w_n)$  est décroissante. Que peut-on en déduire pour les termes de cette suite ?
- (b) Démontrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont convergentes.
- (c) Démontrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  ont même limite.

2) On considère les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies sur  $\mathbb{N}$  par :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n!}$$

- (a) Démontrer que la suite  $(u_n)$  est croissante sur  $\mathbb{N}$  et que la suite  $(v_n)$  est décroissante à partir du rang 2.
- (b) Démontrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes. Que peut-on en déduire ?
- (c) Calculer une valeur approchée de  $u_8$  à  $10^{-5}$  près, et en déduire un encadrement d'amplitude  $10^{-4}$  de la limite commune de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

### PARTIE B

Soit  $n$  un entier naturel,  $n \geq 2$ . On définit sur  $[0, 1]$  les fonctions  $g$  et  $h$  par :

$$g(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = e^{-x} \left( 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) \quad \text{et} \quad h(x) = g(x) + e^{-x} \frac{x^n}{n!}$$

- 1) (a) Montrer que la fonction  $g$  est strictement décroissante sur  $[0, 1]$ .
- (b) Montrer que la fonction  $h$  est strictement croissante sur  $[0, 1]$ .
- (c) Dresser les tableaux de variations de  $g$  et  $h$ .
- (d) En déduire que : (1) :  $g(1) < 1 < h(1)$ .
- 2) Déduire de (1) que pour tout  $n \geq 2$ ,  $u_n < e < v_n$ .
- 3) Déterminer  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ .

## Exercice 2 : complexes (5 points)

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  d'unité  $4\text{cm}$ .

À tout point  $M$  d'affixe  $z$  différent de 1, on associe le point  $M'$  d'affixe  $Z$  définie par

$$Z = \frac{z - 1 + i}{z - 1}$$

Soit  $A$  et  $B$  les points du plan d'affixes respectives 1 et  $1 - i$ .

- 1) Démontrer que l'ensemble  $\mathcal{E}$  des points  $M$  du plan tels que  $|Z| = 1$  est la médiatrice du segment  $[AB]$ , et le représenter sur la figure.
- 2) On pose  $z = x + iy$ .
  - (a) Montrer que

$$\operatorname{Re}(Z) = \frac{(x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}{(x-1)^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(Z) = \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2}$$

- (b) Déterminer l'ensemble  $\mathcal{F}$  des points  $M$  tels que  $Z$  soit réel, et le représenter sur la figure.
  - (c) Déterminer l'ensemble  $\mathcal{G}$  des points  $M$  tels que  $Z$  soit imaginaire pur, et le représenter sur la figure.
- 3)
  - (a) Montrer que  $(Z - 1)(z - 1) = i$ .
  - (b) En déduire que pour tout point  $M$  du plan distinct de  $A$ ,


$$AM' = \frac{1}{AM} \quad \text{et} \quad \left(\vec{u}; \overrightarrow{AM'}\right) = \alpha - \left(\vec{u}; \overrightarrow{AM}\right) \pmod{2\pi}$$

$\alpha$  étant un nombre réel à préciser.

- (c) On considère le point  $M$  défini par :  $AM = 2$  et  $\left(\vec{u}; \overrightarrow{AM}\right) = \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$ .  
Expliquer comment construire le point  $M'$ , et placer  $M$  et  $M'$  sur la figure.

### Exercice 3 : géométrie dans l'espace (5 points)

Soit  $ABCDEFGH$  un cube de côté 1. On note  $T$  le projeté orthogonal de  $A$  sur le plan  $(BDE)$ .



- 1) Quelle est la nature du triangle  $BDE$  ? Justifier votre réponse.
- 2) (a) Démontrer que  $\overrightarrow{BT} \cdot \overrightarrow{ED} = 0$ . Que peut-on en déduire à propos des droites  $(BT)$  et  $(ED)$  ?  
 (b) Démontrer que les droites  $(ET)$  et  $(BD)$  sont orthogonales.  
 (c) Que peut-on en conclure pour le point  $T$  ? Pourquoi ?
- 3) (a) Calculer l'aire du triangle  $BDE$ .  
 (b) Justifier que le volume du tétraèdre  $ABDE$  est égal à  $\frac{1}{6}$ .  
 (c) En exprimant ce volume d'une autre manière, déterminer la distance de  $A$  au plan  $(BDE)$ .
- 4) Dans cette question, on calcule la distance du point  $A$  au plan  $(BDE)$  en utilisant le repère  $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ .  
 (a) Déterminer une équation cartésienne du plan  $(BDE)$ .  
 (b) En déduire la distance de  $A$  au plan  $(BDE)$ .

## Exercice 4 : Probabilités (4 points)

On considère plusieurs sacs de billes  $S_1, S_2, \dots, S_n$  tels que :

- le premier,  $S_1$ , contient 3 billes jaunes et 2 vertes,
- chacun des suivants,  $S_2, \dots, S_n$  contient 2 billes jaunes et 2 vertes.

Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution des tirages successifs d'une bille de ces sacs, effectués de la manière suivante :

- on tire au hasard une bille dans  $S_1$ ,
- on place la bille tirée de  $S_1$  dans  $S_2$ , puis on tire au hasard une bille de  $S_2$ ,
- on place la bille tirée de  $S_2$  dans  $S_3$ , puis on tire au hasard une bille de  $S_3$ ,
- etc.

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $E_n$  l'événement : « la bille tirée dans  $S_n$  est verte » et on note  $p(E_n)$  sa probabilité.

### 1) Mise en évidence d'une relation de récurrence

(a) D'après l'énoncé, donner les valeurs de  $p(E_1)$ ,  $p_{E_1}(E_2)$  (probabilité de  $E_2$  sachant  $E_1$ ) et  $p_{\overline{E_1}}(E_2)$ .

En déduire la valeur de  $p(E_2)$ .

(b) À l'aide d'un arbre pondéré, exprimer  $p(E_{n+1})$  en fonction de  $p(E_n)$ .

### 2) Étude d'une suite

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_1 = \frac{2}{5}$ , et pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5}$ .

(a) Montrer par récurrence que pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n \geq \frac{2}{5}$ .

(b) On pose  $\mu_n = u_n - \frac{1}{2}$ . Montrer que la suite  $(\mu_n)_{n \geq 1}$  est géométrique, et préciser sa raison.

(c) Exprimer  $\mu_n$  en fonction de  $n$ . En déduire que pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2.5^n}$ .

### 3) Évolution des probabilités $p(E_n)$

À l'aide de l'étude de la partie précédente, préciser :

- (a) le sens de variation de cette suite.
- (b) la limite de la suite  $(p(E_n))_{n \geq 1}$ ,